

FACT SHEET

Laryngeal cancer



What is head and neck cancer?

Pendiente

What is larynx cancer?

El cáncer de laringe es un tumor maligno que ocurre con mayor frecuencia en hombres mayores, generalmente en un rango de edad de 40-70 años. El tabaquismo y el consumo de alcohol son los factores de riesgo más importantes. Según la ubicación del tumor, los carcinomas de laringe se pueden clasificar como carcinomas glóticos (que afectan las cuerdas vocales), supraglóticos o subglóticos, de estos el carcinoma glótico es el más común.

1 CAUSES

What causes larynx cancer?

El cáncer de laringe suele ser causado por diferentes etiologías, entre las que destacan el tabaquismo, el consumo de alcohol y la exposición al asbesto. De igual manera las lesiones precancerosas en adultos como leucoplasia o papilomatosis laríngea suelen predisponer a los pacientes a padecerlo. El hecho de que pacientes hayan estado expuestos a radiación de la región de cabeza y cuello, la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH 16 y 18), masticar nuez de betel y consumo de dietas ricas en carnes saladas y grasas dietéticas también suele aumentar el riesgo de incidencia.

2 SYMPTOMS

What are the symptoms of larynx cancer?

Los síntomas del cáncer de laringe son ronquera o cambios en la voz, sensación de cuerpo extraño, dificultad para respirar, dificultad para pasar comida y aspiración al comer o beber. A la exploración física los pacientes suelen presentar un estridor respiratorio, el cual es un sonido o silbido agudo que se escucha al inhalar.

3 DIAGNOSIS

How is larynx cancer diagnosed?

El cáncer de laringe se realiza mediante una laringoscopia directa la cual suele revelar lesiones irregulares, nodulares o ulcerativas. Una vez obtenida la muestra se realiza examen microlaringoscópico y biopsia de tejido para poder diferenciar el cáncer de laringe de alguna lesión benigna. De igual manera, se suele realizar un estudio llamado examen estroboscópico en el que se evalúa la movilidad de las cuerdas vocales durante la fonación. En cuanto a los estudios de imagen utilizados, es común el uso de alguna tomografía computarizada, resonancia magnética o ultrasonido del cuello para evaluar el tamaño del tumor y la posible diseminación a tejidos vecinos como ganglios linfáticos.

4 TREATMENT

What is the treatment for larynx cancer?

El tratamiento del cáncer de laringe varía dependiendo de la etapa en la que este se encuentre. En etapas tempranas se realiza radioterapia o resección endoscópica transoral con láser. En estadios avanzados (en los que ya suele haber metástasis) se realiza laringectomía, la cual consiste en extirpar toda o la parte de la laringe afectada por el tumor.

What kind of follow-up do patients with larynx cancer need?

Los pacientes con cáncer de laringe requieren un seguimiento en cuanto al manejo de su voz. Es importante que los pacientes sean sometidos a rehabilitación de la voz después de una laringectomía, en la que se puede entrenar al paciente para producir el habla a partir de la vibración en la faringe mediante prótesis de voz o ayuda electrónica para hablar.

What is the prognosis for larynx cancer?

El cáncer de laringe, específico el carcinoma glótico se presenta temprano con ronquera y generalmente se asocia con un buen pronóstico. Al contrario del carcinoma supraglótico y subglótico que se presentan tardíamente, y por lo tanto, se asocian con un mal pronóstico.



Otorrinolaringólogo con alta especialidad
en cirugía oncológica de cabeza y cuello.

Dr. Adolfo Montemayor

Cirujano especialista en cáncer de tiroides