


FACT SHEET

Oropharynx cancer



What is head and neck cancer?

Pendiente

What is oropharynx cancer?

Los cánceres faríngeos incluyen todos los tumores malignos que surgen en la nasofaringe, la orofaringe, la hipofaringe y las amígdalas. De estos, el cáncer de orofaringe es el más común y su prevalencia es mayor en hombres que en mujeres.

1 CAUSES

What causes oropharynx cancer?

La presentación del cáncer de orofaringe está asociado a una diversidad de factores de riesgo, entre los que se encuentran la infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH); tabaquismo; alcoholismo; consumo de nitrosamina de alimentos salados/en conserva; obesidad; deficiencia crónica de hierro; consumo a largo plazo de alimentos cancerígenos (ejemplo: aflatoxina) y exposición previa a radiación.

2 SYMPTOMS

What are the symptoms of oropharynx cancer?

El cáncer de faringe suele ser asintomático durante mucho tiempo. A menudo, las primeras manifestaciones son los ganglios linfáticos cervicales inflamados, el cual es muy característico del cáncer de orofaringe. Otros de los síntomas que se suelen presentar son sensación de cuerpo extraño, disfagia, dolor de garganta, voz apagada y dolor de oído severo.

3 DIAGNOSIS

How is oropharynx cancer diagnosed?

El diagnóstico del cáncer de orofaringe se realiza mediante una panendoscopia con biopsia, el cual es un estudio que permite la visualización del tumor y la anatomía circundante. La prueba confirmatoria del cáncer es mediante un examen histopatológico, el cual va a determinar el tipo, el grado y la extensión del tumor. De igual manera, se puede realizar un TAC o resonancia magnética para evaluar la profundidad de la infiltración del tumor y la invasión de las estructuras circundantes.

4 TREATMENT

What is the treatment for oropharynx cancer?

El tratamiento del cáncer de orofaringe depende de su estadio y de factores individuales del paciente, como el padecer de alguna enfermedad crónica. Las opciones de manejo incluyen radioterapia, quimioterapia, diferentes enfoques quirúrgicos o una combinación de medidas.

What kind of follow-up do patients with oropharynx cancer need?

Una vez realizado el tratamiento de cáncer de orofaringe, durante el primer año se deben realizar revisiones cada dos meses, para pasar a tres meses en el segundo año. Entre tres y cinco años de tratados, se harán cada cinco o seis meses. A partir del quinto año, se deben revisar entre nueve meses y un año. Anualmente se les debe realizar una radiografía de tórax y una determinación en sangre de la hormona TSH si se recibió radioterapia.

What is the prognosis for oropharynx cancer?

El pronóstico del cáncer de orofaringe no suele ser positivo, ya que los tumores se descubren comúnmente en etapas tardías.



Otorrinolaringólogo con alta especialidad en cirugía oncológica de cabeza y cuello.

Dr. Adolfo Montemayor

Cirujano especialista en cáncer de tiroides